

Gliflozinen = SGLT2-inhibitoren

TOEDIENING EN POSOLOGIE

Posologie?

	Posologie?	Wanneer? Voeding?
Canagliflozine (Invokana®)	100 mg 1 x /dag Indien nodig, eGFR \geq 60 ml/min en goede tolerantie \rightarrow 300 mg 1 x /dag	Bij voorkeur vóór de eerste maaltijd van de dag
Dapagliflozine (Forxiga®)	10 mg 1 x /dag	Met of zonder voedsel
Empagliflozine (Jardiance®)	10 mg 1 x /dag Indien nodig, eGFR \geq 60 ml/min en goede tolerantie \rightarrow 25 mg 1 x /dag	Met of zonder voedsel
Ertugliflozine (Steglatro®)	5 mg 1x/dag Indien nodig, eGFR \geq 60 ml/min en goede tolerantie \rightarrow 15 mg 1 x /dag	Met of zonder voedsel

Dosisaanpassingen?

	Ouderen? (\geq 65)	Leverinsufficiëntie?*
Canagliflozine (Invokana®)	Rekening houden met de nierfunctie en het risico op volumedepletie; vooral wanneer dosis verhoogd wordt bij personen \geq 75	Lichte of matige: geen dosisaanpassing nodig Ernstig: niet onderzocht, doseeradvies niet mogelijk
Dapagliflozine (Forxiga®)	Geen dosisaanpassing nodig, wel rekening houden met de nierfunctie en het risico op volumedepletie; \geq 75: niet aanbevolen (beperkte ervaring)	Lichte of matige: geen dosisaanpassing nodig Ernstig: startdosis van 5 mg, indien goede tolerantie \rightarrow 10 mg
Empagliflozine (Jardiance®)	Geen dosisaanpassing nodig \geq 75: verhoogd risico op volumedepletie \geq 85: niet aanbevolen	Lichte of matige: geen dosisaanpassing nodig Ernstig: beperkte ervaring maar geen nadelige effecten bekend; opstart niet aanbevolen, eventueel laag starten (10 mg) en eventueel verhogen i.f.v. effect en bijwerkingen.
Ertugliflozine (Steglatro®)	Geen dosisaanpassing nodig. Rekening houden met nierfunctie en risico op volumedepletie. \geq 75: beperkte ervaring	Lichte of matige: geen dosisaanpassing nodig Ernstig: niet onderzocht, niet aanbevolen.

* Uit studies blijkt dat de veranderingen in de farmacokinetiek bij patiënten met levercirrose waarschijnlijk niet klinisch relevant zijn. SGLT-2-remmers worden goed getolereerd bij deze patiënten, maar er is nog weinig bekend over de lange termijn veiligheid.

	Lichte nierinsufficiëntie (eGFR 60-89 ml/min/1.73 m2)	Matige nierinsufficiëntie (eGFR 30-59 ml/min/1.73 m2)	Ernstige nierinsufficiëntie (eGFR < 30 ml/min/1.73 m2)
Canagliflozine (Invokana®)	Geen dosisaanpassing nodig	Niet opstarten eGFR > 45ml/min/1.73 m2 en reeds opgestart: 100 mg 1 x / dag, nierfunctie en glykemie regelmatig controleren, extra waakzaamheid indien dehydratatie of orthostatische hypotensie (ev. tijdelijk stopzetten) eGFR < 45 ml/min/1.73 m2: stoppen!	Niet aanbevolen
Dapagliflozine (Forxiga®)	Geen dosisaanpassing nodig	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
Empagliflozine (Jardiance®)	Geen dosisaanpassing nodig	Niet opstarten Wanneer al opgestart: 10 mg 1 x / dag; indien eGFR < 45 ml/min/1.73 m2: stoppen!	Niet aanbevolen
Ertugliflozine (Steglatro®)	Geen dosisaanpassing nodig	Niet opstarten Als al opgestart: vaker controle nierfunctie Aanhoudend eGFR < 45 ml/min/1,73m²: stoppen!	Niet aanbevolen