

## Incretinemimetica = GLP-1 analogen = GLP 1 receptoragonisten

### ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING EN VRUCHTBAARHEID.

#### Zwangerschap:

- ✓ Niet aanbevolen bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.
  - ✓ Niet gebruiken wanneer patiënte zwanger is of wil worden → overschakelen op insuline
- 
- **Albiglutide (Eperzan®):** minstens 1 maand voor een geplande zwangerschap stoppen.
  - **Dulaglutide (Trulicity®):** geen aanbevelingen i.v.m. termijn van stoppen voor zwangerschap.
  - **Exenatide (Bydureon®):** minstens 3 maanden vóór een geplande zwangerschap stoppen.
  - **Exenatide (Byetta®):** 24 uur na een dosis is de hoeveelheid plasma exenatide reeds verwaarloosbaar klein.
  - **Liraglutide (Victoza®):** 3 à 4 dagen na een dosis is de hoeveelheid plasma liraglutide verwaarloosbaar klein.
  - **Lixisenatide (Lyxumia®):** er zijn geen aanbevelingen i.v.m. termijn van stoppen voor zwangerschap maar de halfwaardetijd van lixisenatide is zeer kort.
  - **Semaglutide (Ozempic®):** ten minste 2 maanden voor een geplande zwangerschap stoppen.
  - **Semaglutide (Rybelsus®):** ten minste 2 maanden voor een geplande zwangerschap stoppen.

#### Borstvoeding:

Overdracht naar moedermelk is niet bekend en het wordt dus niet aangeraden om te gebruiken tijdens de borstvoeding aangezien het risico voor de baby niet kan uitgesloten worden.

#### Vruchtbaarheid:

Er zijn geen gegevens over de effecten van de GLP-1 analogen op de vruchtbaarheid bij de mens.